



# Otra mirada al algoritmo estándar

Restémosle a números que tienen ceros.

## Calentamiento

### Conversación numérica: Diferencias

Encuentra mentalmente el valor de cada diferencia.

- $87 - 24$

- $387 - 124$

- $6,387 - 129$

- $6,387 - 4,329$



## Actividad 1

### Muchos ceros

1. En cada caso, encuentra el valor de la diferencia.

a.

$$\begin{array}{r} 700 \\ - 16 \\ \hline \end{array}$$

b.

$$\begin{array}{r} 7,000 \\ - 16 \\ \hline \end{array}$$

c.

$$\begin{array}{r} 70,000 \\ - 16 \\ \hline \end{array}$$

d.

$$\begin{array}{r} 700,000 \\ - 16 \\ \hline \end{array}$$

2. En cada caso, encuentra el número que hace que la expresión sea verdadera.

a.

$$\begin{array}{r} 43 \\ + \\ \hline 200 \end{array}$$

b.

$$\begin{array}{r} 43 \\ + \\ \hline 2,000 \end{array}$$

c.

$$\begin{array}{r} 43 \\ + \\ \hline 20,000 \end{array}$$

d.

$$\begin{array}{r} 43 \\ + \\ \hline 200,000 \end{array}$$



## Actividad 2

### Formas de encontrar diferencias

Priya y Han intentan encontrar el valor de  $20,000 - 472$ . Ellos usan 2 métodos distintos para plantear sus cálculos.

**Priya**

$$\begin{array}{r} 20,000 \\ - 472 \\ \hline \end{array}$$

**Han**

$$\begin{array}{r} 472 \\ + 20,000 \\ \hline \end{array}$$

1. Usa ambos métodos para encontrar la diferencia entre 20,000 y 472.
2. Kiran usa otro método. Explica cómo encuentra Kiran el valor de  $20,000 - 472$ .

$$472 + 8 = 480$$

$$480 + 20 = 500$$

$$500 + 500 = 1,000$$

$$1,000 + 19,000 = 20,000$$

$$19,000 + 500 + 20 + 8 = 19,528$$

---

---

---

---

3. ¿Cuál método prefieres? ¿Prefieres encontrar la diferencia de otra forma? Explica tu razonamiento.

---

---

---

---

4. Encuentra el valor de  $50,400 - 1,389$ . Muestra cómo razonaste.

